

## DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İşlemi takip eden günlerde idrarda kanama, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi şikâyetler olması durumunda hastanemize başvurulması önerilmektedir. J stent'e bağlı olarak sık idrara çıkma, idrar sonrası kanama oluşabilmektedir.

J stent çekildikten sonra ameliyat olan tarafta yan ağrısı olması durumunda hastanemize başvurulması önerilmektedir.

Hasta ameliyat olduktan 1 hafta sonra banyo yapabilir.



### KONTROL

Ameliyattan 3 hafta sonra Salı veya Perşembe günleri olacak şekilde Çocuk Üroloji Polikliniği'ne (1. Kat E koridoru) kontrole gelmeniz önerilir.



Tasarım : Hastaneler Bilgi İşlem Merkezi



T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK UYGULAMA  
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



## ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIĞI NEDİR?

Ameliyat Öncesi  
Hazırlık

Üreteropelvik  
Bileşke Ameliyatı  
(Pyeloplasti)  
Nedir ?

Ameliyat Riskleri  
Nelerdir?




## ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIĞI NEDİR?

Böbrek ve idrar kanalının birleşme yerinde doğuştan görülen darlığa üreteropelvik bileşke darlığı (UP darlık) adı verilmektedir. Bu darlık sonucunda böbrekten idrar kanalına idrar geçişi azalmakta ve böbrekte genişleme (hidroneforoz) oluşmaktadır. Eğer zamanında müdahale edilmez ise böbreğin süzme fonksiyonu azalmaktadır. Böbrekteki bu fonksiyon kaybı kalıcı olmakla birlikte zamanında tedavi edilmez ise zamanla ilerleyici olmaktadır. Tedavide ameliyatla bu darlık bölgesi çıkarılarak idrar kanalı ve böbrek tekrar birleştirilmektedir.

## AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

- İşlem anestezi altında yapılacağı için hastanın ameliyattan 4-6 saat önce beslenip sonrasında hiçbir şey yiyip içmemesi gerekmektedir.
- İdrar kültüründe üreme olamaması gerekmektedir.



## ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE AMELİYATI (PYELOPLASTİ) NEDİR ?

Kapalı (laparoskopik) ya da açık yolla böbrek idrar kanalı birleşim yerine ulaşarak dar bölge kesilerek çıkartılır. Araya J stent yerleştirilerek idrar kanalı böbreğe yeniden dikilmektedir. Böylece böbrekteki idrarın boşaltılması kolaylaşmaktadır. J stent erken dönemde yeniden darlık gelişmesi önlemekte ve böbrekteki idrarın idrar torbasına rahat bir şekilde boşaltmasını sağlamaktadır. Ortalama 90-120 dk süren operasyondan sonra hasta ameliyathaneden çocuk üroloji servisine dren ve sonda ile çıkmaktadır. Sonda 1-2 gün sonra, dren ise 2-3 gün sonra çekilmektedir. J stent ise 6 hafta sonra ameliyathane şartlarında kapalı ışıklı sistemle idrar borusundan girilerek çekilmektedir. Hastanın cildi emilebilir dikiş malzemeleri ile kapatıldığından ameliyat sonrası dikiş aldırma işlemi gerekmemektedir.

Ameliyat sonrası hastalar, anestezi aldıkları için 4-6 saat süreyle hiçbir şey yiyip içmemelidir.

## J STENT NEDİR?

Böbreklerden idrar torbasına idrar geçişini sağlamak için idrar kanalına yerleştirilen ince, yumuşak, içi boş plastik bir tüptür. Stentin her iki ucunda buldukları yerlerde sabit durabilmeleri j kıvrımları bulunmaktadır. Bu stent ameliyat sonrasında idrar kanalının daralmasını önler.

## AMELİYAT RİSKLERİ NELERDİR?

**Kanama:** Ameliyat açık ya da kapalı yapılmaktadır. Kesi bölgelerinden ya da dren geçilen bölgeden kanama düşük olasılıkla da olsa görülebilmektedir. Görülen kanama genellikle ciddi miktarda olmayıp kan vermeyi gerektirmemektedir.

**Ateş:** Operasyon sonrası birkaç gün hafif ateş yüksekliği gelişebilmektedir. Yapılan ameliyat idrar yolları ile ilişkili olduğu için düşük oranda da olsa idrar yolu enfeksiyonu gelişebilmektedir. Hastaların taburcu olduktan sonra 38 dereceli geçen ateşi ve halsizliği olursa, mutlaka hastanemize başvurmaları gerekmektedir.

**Tekrar tedavi gereksinimi:** Ameliyat sonrası dönemde j stent çekildikten sonra yeniden birleştirilen bölgede yara iyileşmesine bağlı olarak tekrar darlık gelişebilmektedir. Bu durum da hastaya yeniden aynı ameliyat gereksinimi doğurabilmektedir.

