

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İşlemi takip eden günlerde idrarda kanama, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi şikâyetler olması durumunda hastanemize başvurulması önerilmektedir.

Çift J stentler 6 hafta süreyle kalacağından hastanın sondası alındıktan sonra, idrar sonrası hafif kanamalar ve böğür ağrısı olabilir. Hasta ameliyattan 1 hafta sonra banyo yapabilir.



KONTROL

Ameliyattan 3 hafta sonra Salı günü olacak şekilde Çocuk Üroloji Poliklinik'ne (1. Kat E Koridoru) kontrole gelmeniz önerilir. Çift J stent çekilmesi için ameliyattan 6 hafta sonraya randevu verilecektir.

Poliklinik kontrolü sırasında hastanın takip planı düzenlenecektir.



Tasarım : Hastaneler Bilgi İşlem Merkezi



T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



ÜRETERONEOSİSTOSTOMİ NEDİR?

(İDRAR KANALI VE İDRAR
TORBASININ YENİDEN
BİRLEŞTİRME AMELİYATI)

Ameliyat Kimlere
Yapılmaktadır?

Ameliyat Riskleri
Nelerdir?

Dikkat Edilecek
Hususlar

ÜRETERONEOSİSTOSTOMİ (İDRAR KANALI VE İDRAR TORBASININ YENİDEN BİRLEŞTİRME AMELİYATI) NEDİR?


Kısaca UNC olarak adlandırılan bu ameliyat, göbeğin alt kısmından yaklaşık 4-5 cm'lik bir kesi yapılarak idrar kanalı ya da kanallarının mesane ile birleştirdiği yerden ayrılarak yeniden idrar torbasına dikilmesi işlemidir.

Ameliyat kimlere yapılmaktadır?

İdrar torbasından böbreklere yüksek dereceli idrar kaçağı (veziköüretalreflü) olan hastalarda ve idrar kanalının idrar kesesine bağlandığı yerde darlığı (üreterovezikal bileşke darlığı) olan hastalara bu ameliyat yapılmaktadır.

HAZIRLIK

- İşlem öncesi hastadan bakılan idrar kültüründe üreme olmaması gerekmektedir.
- Hasta anestezi alacağı için ameliyattan 4-6 saat önce beslenip sonrasında hiçbir şey yiyip içmemelidir.




AMELİYAT

Ameliyat genel anestezi altında yapılmakta olup yaklaşık olarak 1,5-2 saat sürmektedir. İdrar kesesine idrar kanalları yeniden konumlandırılmaktadır. Ameliyat sırasında idrar kanallarına J stent adı verilen içi boş yumuşak bir plastik bir tüp konulmaktadır. Böylece böbreklerdeki idrar, idrar torbasına kolayca ulaşabilmektedir. Ameliyat sonrası hastalar anestezi aldıkları için 6 saat süreyle hiçbir şey yiyip içmemelidir.

Ameliyat sonrası takılan idrar sonrası ortalama 7 gün kalmaktadır.

Ameliyat sırasında takılan J stent hastada 6 hafta kalmaktadır. Sonra yine anestezi altında ışıklı endoskopi sistemi ile alınmaktadır.

Ameliyat sonrası cilt emilebilir ipliklerle dikileceğinden, dikiş aldırma işlemi gerekmemektedir.



AMELİYAT RİSKLERİ NELERDİR?

Kanama: Bu ameliyatta idrar kesesi açılabilmesi için idrar sondasında birkaç gün süreli kanama görülebilir. Bu kanamalar genellikle ciddi miktarda olmayıp kan verilmesi gerektirmemektedir.

Ateş: Operasyon sonrası birkaç gün hafif ateş yüksekliği gelişebilmektedir. Hastaların taburcu olduktan sonra 38 dereceyi geçen ateşi ve halsizliği olursa, mutlaka hastanemize başvurmaları gerekmektedir.

Tekrar tedavi gereksinimi: Ameliyatın başarı oranları % 95'e yakın oranlarda olduğundan yeniden ameliyat gereksinimi yok denecek kadar azdır.