

UYARILAR

Operasyon sonrası dönemde idrar yapamama, idrardan yoğun miktarda kan gelmesi, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi şikâyetler gelişmesi durumunda hastanemize başvurmanız gerekmektedir.

İşlemden 3 hafta sonra Salı veya Perşembe günü Çocuk Üroloji Polikliniği'ne (1. Kat E koridoru) kontrole gelmeniz önerilir.



Tasarım : Hastaneler Bilgi İşlem Merkezi



T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



SİSTOSKOPİ NEDİR?

Ameliyat Hakkında
Bilgiler

Ameliyat
Sonrası Öneriler
Nelerdir?

Uyarılar

SİSTOSKOPİ NEDİR?


Sistoskopi işlemi ışıklı kamera sistemi ile idrar borusu (üretra) ve idrar kesesinin (mesane) incelenmesi demektir. İşlemden önce idrar borusunda darlık, yapışıklıklar, katlantılar; idrar torbasınının boynunda yükseklik, yetmezlik; idrar torbasında cepcikler, genişlemeler; idrar kanal (üreter) açıklıklarında yetmezlik varlığı araştırılmaktadır. Sadece tanı amaçlı yapıldığı gibi işlem sırasında hastalıklı bir durum olması durumunda müdahaleye de olanak sağlamaktadır.



Flexible Sistoskop

AMELİYAT HAKKINDA BİLGİLER


Anestezi altında ışıklı kamera sistemi (sistoskop) ile idrar kanalından girilerek, idrar borusundan geçilerek, idrar torbasına girilir. İşlem ek bir girişim gerekmemesi durumunda 5 dakika gibi kısa bir sürede uygulanmaktadır. Anestezi verileceği için hasta işlemden 4-6 saat önce beslenip sonrasında ağızdan su dahil hiçbir şeyin alınmamış olması gerekmektedir. Operasyon sonrası hastalar 2-3 saat ayılma ünitesinde takip edildikten sonra aynı gün taburcu edilebilmektedir.



Erkek Genetal Sistemi

AMELİYAT SONRASI ÖNERİLER NELERDİR?

- Ameliyattan sonra 2 saat süreyle bir şey yenilip içilmemelidir.
- Ameliyattan sonra birkaç gün idrar yaparken yanma ve idrar renginde hafif kızarıklık görülebilir. Bu durumda su alımının artırılması önerilmektedir.
- Ameliyat olduğu gün hasta banyosunu yapabilir.



Kadın Genetal Sistemi