



Tasarım : Hastaneler Bilgi İşlem Merkezi

K-Q
TSE-ISO-EN
9000



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ




**İNMEMİŞ
TESTİS**

Yayın No : 116

İNMEMİŞ TESTİS NEDİR?

Doğmadan önce her iki testis karın boşluğundadır. Bebek anne karnında gelişimine devam ederken testisler de torbaya (skrotum) inmeye başlarlar. Karın içi boşluğundan sonra kasık bölgesini geçerek doğuma yakın torbaya yerleşirler. Tek veya her iki testisin bu inişi tamamlanamamasına ve torbaya yerleşememesine **inmemiş testis** denir.



İNMEMİŞ TESTİS NEDEN TEDAVİ EDİLMELİDİR?

- Gelecekte çocuk sahibi olma şansını düşürebilir
- Kansere gelişimine yol açabilir
- Beraberinde kasık fıtığı olabilir
- Psikolojik ve estetik problem oluşturabilir

AMELİYAT HAKKINDA BİLGİLER

- İdeal ameliyat zamanı 6-12. aylar olup en geç 18. aya kadar yapılmalıdır
- İnmemiş testis ameliyatı genel anestezi altında ortalama 1-1,5 saat sürmektedir
- Ameliyat sırasında varsa fıtık onarımı da yapılmaktadır

- Anestezi verileceği için hastanın işlemden 6 saat önce su veya katı gıda almamış olması gerekir
- Ameliyat sonrası 2-3 saat anestezi gözlem ünitesinde kalan hastalar aynı gün taburcu edilirler
- Taburcu olurken ağrı kesici-ateş düşürücü özelliği olan ilaçlar reçete edilir.
- Dikişler kendiliğinden eridiklerinden dolayı herhangi bir dikiş alınma işlemi uygulanmaz.
- Ameliyattan 5 gün kadar sonra banyo yapılabilir
- Güreş, futbol, yüzme ve jimnastik gibi sporlar 3 hafta yasaklanır
- Ameliyat sonrasında torbada ve kasıkta hafif şişlik ve morluklar olabilir. Bunlar günler içinde kendiliğinden kaybolur.

UYARILAR

Ameliyat bölgesinde aşırı şişlik, kızarıklık varsa; yaradan kan ve iltihap geliyorsa; ateş, bulantı, kusma gibi belirtiler varsa hastanemize başvurmalsınız.

Ameliyattan 10 gün sonra

Salı günü olacak şekilde

Çocuk Üroloji Polikliniği'ne

(1. Kat E koridoru)

kontrole gelmeniz önerilir.



İLETİŞİM

Çocuk Üroloji Polikliniği

0 352 207 6666

Dahili No : 21127 / 21136

erciyescocukuroloji@gmail.com