



Tasarım : Hastaneler Bilgi İşlem Merkezi


K-Q
TSE-ISO-EN
9000



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ




ÇİFT J STENT TAKILMASI VE ÇIKARILMASI



Yayın No : 113

ÇİFT J STENT (DOUBLE J) NEDİR?



Böbreklerden mesaneye idrar geçişini sağlamak için idrar kanalına (üretere) yerleştirilen ince içi boş plastik bir tüptür. Stentin her iki ucunda stentin yerinde durabilmesini sağlayan J şeklinde kıvrımları bulunur. Çift J stent tıkanıklığı engelleyerek böbreklerden mesaneye idrarın iletilmesini sağlar.

AMELİYAT HAKKINDA BİLGİLER

Çift j stent takılma ve çıkarılma işlemi anestezi altında ışıklı kamera (sistoskopi) ile idrar kanalından girilerek oldukça kısa sürede uygulanmaktadır (10-15 dk).

Anestezi verileceği için hastanın işlemden 6 saat önce su veya katı gıda almamış olması gerekir. Ameliyattan sonra 2-3 saat ayılma ünitesinde takip edilen çocuklar aynı gün taburcu edilmektedirler.

TAKILAN STENTLER NE KADAR KALIR?

- Taş cerrahisi sonrası 2-3 hafta kalır
- Üreteroneosistostomi (UNC) operasyonlarından sonra 5-6 hafta kalır
- Üreteropelvik bileşke darlığı (UPJ darlık) operasyonlarından sonra 6 hafta kalır
- Bazı hastalıklarda (UV darlık, üreter darlığı vb.) belirli aralıklarla (3 ayda bir) değiştirilmesi gerekebilir

ÇİFT J STENT VARKEN NELER OLABİLİR?

Tüpün alttaki kıvrımı mesaneyi rahatsız ederek sürekli tualete gitme ihtiyacı hissettirebilir. Ayrıca idrar yapma sırasında böbrek bölgesinde hafif-orta derecede rahatsızlığa neden olabilir ve bu durumda idrarda kan görülebilir. Bu belirtilerin hiçbirisi zararlı değildir ve vücudunuz stente zaman içinde alışır. Basit ağrı kesiciler şikâyetleri kontrol etmede işe yarayabilir. Tüm belirtiler nihai tedavi tamamlandığında stent çıkarılınca kaybolur.

UYARILAR

Bu stentler sadece geçici olarak kullanılır ve vücuttan çıkarılması veya değiştirilmesi gereklidir. Stentler takıldıktan sonraki en geç 3 ay içinde çıkarılmalı veya değiştirilmelidir. Unutulan veya çıkarılmayan stentler taş oluşumuna neden olarak yapılacak işlemleri zorlaştırabilir. Stent olduğunu hatırlamanız ve bunu unutmamanız önemlidir.

İşlemden 3 hafta sonra

Salı günü

Çocuk Üroloji Polikliniği'ne

(1. Kat E koridoru)

kontrole gelmeniz önerilir.



İLETİŞİM

Çocuk Üroloji Polikliniği

0 352 207 6666

Dahili No : 21127 / 21136

erciyescocukuroloji@gmail.com