



Tasarım : Hastaneler Bilgi İşlem Merkezi

K-Q
TSE-ISO-EN
9000



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ




HİPOSPADİAS AMELİYATI

Yayın No : 115

HİPOSPADİAS NEDİR?

Hipospadias, erkek bebeklerde görülen halk arasında "Peygamber Sünnetli" (doğuştan yarım sünnetli) olarak ifade edilen, sünnet derisinin penis başının alt yüzünde oluşmaması ve çocuğun idrar yaptığı deliğin penisin altında olmasıdır. Bu delik ile penis ucu arasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır.



HİPOSPADİAS NEDEN TEDAVİ EDİLMELİDİR ?

- İdrar penisin altından çıktığı için karşıya doğru değil de, aşağıya doğru işemeye neden olabilir.
- Penis sertleştiği zaman aşağı doğru eğilmesine neden olabilir.
- Erişkin dönemde cinsel sıkıntılar oluşturabilir.
- Psikolojik ve kozmetik problemler oluşturabilir.

HİPOSPADİAS AMELİYATI HAKKINDA BİLGİLER

Hipospadias'ın tek tedavisi cerrahidir. Ameliyat için uygun yaş 6-18. aylardır. Seçilen yöntemle ilgili olarak operasyon 1-3 saat sürer. Anestezi verileceği için hastanın işleminden

6 saat önce su veya katı gıda almamış olması gerekir. Operasyonda penisin sertleştiği zaman aşağıya doğru kıvrılmasına (penil kordi) neden olan fibrotik bantlar temizlenerek aşağı olan eğrilik düzeltilir. İdrar kanalının açıldığı noktadan penisin ucuna kadar eksik olan idrar kanalı yeniden oluşturulur. Yassılaştırmış halde bulunan penis başına doğal konik şekli verilir. Hipospadias tedavisinde hastalığın tipine göre farklı cerrahi modeller uygulanır. Hastalığın ciddiyeti ve uygulanan yöntemle göre aynı gün hastaneden taburcu edilebileceği gibi 1-7 gün arasında değişen sürede yatış yapılabilir. Ameliyat sırasında idrar kanalına takılan sonda 7-10 gün sonra çıkarılmaktadır. Atılan dikişler kendi kendine eridiğinden dolayı dikiş alınma işlemi uygulanmaz.

UYARILAR

Ameliyat sonrası erken dönemde; kanama, dikişlerin açılması, enfeksiyon gibi tüm ameliyatlarda görülme riski olan komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Geç dönemde ise; fistül (delik), stenoz (darlık), kordi tekrarlamasına bağlı peniste aşağı doğru eğrilme görülebilmektedir. Bu komplikasyonlar ek cerrahi işlemler gerektirebilir.

Ameliyattan 1 hafta sonra
Salı günü Çocuk Üroloji Polikliniği'ne
(1. Kat E koridoru)
kontrole gelmeniz önerilir.



İLETİŞİM

Çocuk Üroloji Polikliniği

0 352 207 6666

Dahili No : 21127 / 21136

erciyescocukuroloji@gmail.com