 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1975	ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	DOKÜMAN KODU:	EN.TL.06
	CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ TALİMATI	YAYIN TARİHİ:	KASIM 2010
		REVİZYON NO:	01
		REVİZYON TARİHİ:	HAZİRAN 2018
		SAYFA NO:	1 / 2

1. AMAÇ: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde cerrahi alan enfeksiyonlarını önlenmeye yönelik standart uygulamaların belirlenmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM: Cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemeye yönelik standart uygulamalarını kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Hasta tedavisinde, takibinde, bakımında, transferinde yer alan Tüm Çalışanlar.

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1. Ameliyat Öncesi Dönem Önerileri:

6.1.1. Hastanın Hazırlanması:

- Engel oluşturmayan kıllar ameliyat öncesi **kesilmemelidir**.
- Eğer kıl tıraşı mutlaka gerekli ise tıraş makinası kullanılmalı ve kıllar **ameliyat masasında** kesilmelidir.
- Diyabetik hastaların kan şekeri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası kontrol altında (<200 mg/dl) olmalıdır.
- Hastaların ameliyattan en az 30 gün öncesinden itibaren sigara kullanmaması önerilmelidir.
- Hastanede ameliyat öncesi kalış süresi mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. 24 Saatten uzun süre yatan hastalara ameliyattan önce **antiseptikli solüsyon (klorheksidin) ile banyo** yaptırılmalıdır.
- Cilt hazırlığı için uygun antiseptik (povidon iyot, klorheksidin) kullanılmalıdır.
- Cildin antiseptikle hazırlığı, **insizyon hattından dışa doğru** dairesel şekilde uygulanmalı ve insizyon öncesi kuruması beklenmelidir. Hazırlanan alan kesi değişimlerine, dren yerleştirmeye izin veren yeterlilikte olmalıdır.


6.1.2. Cerrahi Ekip:

- Ameliyata girecek tün ekip, ameliyata girmeden önce cerrahi el yıkama ya da alkollü el ovalama (**bkz. El Hijyeni Talimatı**) yapılmalıdır.
- **Ameliyat odasına girerken** ağız ve burnu kapatacak şekilde maske, saçları tamamen kapatacak bone takılmalıdır.
- Steril cerrahi eldiven, steril cerrahi önlük giyildikten sonra takılmalıdır.
- **Ameliyathane kıyafetleriyle** dışarıya çıkılmamalıdır.
- Bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulgu ve semptomu olan cerrahi personel durumu hakkında yetkililere haber vermelidir.
- Cildinde akıntılı lezyonu olan cerrahi personel tetkik ve tedaviyle enfeksiyonu düzelene kadar ameliyatlara katılmamalıdır.

6.1.3. Antimikrobiyal Profilaksi:

- Antibiyotik profilaksisi temiz - kontamine ve bazı özel durumlarda temiz ameliyatlarda uygulanmalıdır.
- Antibiyotik profilaksisi "**Cerrahi Antibiyotik Profilaksi Rehberinde**" belirtilen ilkelere göre uygulanmalıdır.

HAZIRLAYAN: ENFEKSİYON KONTROL KURULU	KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN: BAŞHEKİM
--	---	--------------------------------------

 <p>ERCIYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1975</p>	ERCIYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	DOKÜMAN KODU:	EN.TL.06
		YAYIN TARİHİ:	KASIM 2010
	CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ TALİMATI	REVİZYON NO:	01
		REVİZYON TARİHİ:	HAZİRAN 2018
		SAYFA NO:	2 / 2

6.2. Ameliyat Dönemi Önerileri:

6.2.1. Havalandırma:

- Ameliyathanede pozitif basınçlı ventilasyon ve laminar hava akımı olmalıdır.
- Sirküle hava kullanımında standart filtreler kullanılmalıdır.
- Ameliyathanede ultraviyole (UV) ışını sadece solunum yoluyla bulaşan (akciğer ve larenks tüberkülozu, suçiçeği, kızamık, v.b.) aktif enfeksiyonu olan hastaların ameliyatlarından sonra kullanılmalıdır.
- **Ameliyat öncesi gerekli malzemeler oda içerisine alınmalı ve ameliyat sırasında kapı açılmamalı, personel giriş - çıkışı olmamalıdır. Ameliyathane pencereleri açılmamalıdır.**
- Ameliyathanede **mümkün olduğu kadar az personel** bulunmalı ve ameliyat sırasında mümkün olduğu kadar **az konuşulmalı ve hareket edilmelidir.**

6.2.2. Ameliyathane:

- Ameliyat odası ve yüzeyler Enfeksiyon Kontrol Kurulunun önerdiği dezenfektan ve konsantrasyonlarda **ameliyat aralarında** temizlenmelidir.
- Steril aletler ve solüsyonlar kullanımdan **hemen önce** açılmalıdır.
- Ameliyat odasından rutin kültür alınmamalıdır. Salgın düşünülen durumlarda Enfeksiyon Kontrol Kurulunun önerileri doğrultusunda ortam kültürü alınmalıdır.

6.3. Ameliyat Sonrası Dönem Önerileri:

- Açık yaraya temasta steril eldiven giyilmelidir.
- Pansumanda uygun el hijyeni ve eldiven kullanımı sağlanmalıdır (**bkz. El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı**).

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- 7.1. Doğanay M, Ünal S, Hastane İnfeksiyonları, Ankara, Bilimsel Tıp Yayınevi,2003.
- 7.2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
- 7.3. Sağlıkta Kalite Standartları
- 7.4. Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

HAZIRLAYAN: ENFEKSİYON KONTROL KURULU	KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN: BAŞHEKİM
--	--	-------------------------------