



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
AĞRI DEĞERLENDİRME SKALALARI
(ÇOCUK HASTALAR İÇİN)



HASTA BİLGİLERİ	TARİH:	08-16 HEMŞİRE:	16-24 HEMŞİRE:	24-08 HEMŞİRE:
ADI – SOYADI:	SERVİSİ:	AĞRININ BAŞLADIĞI SAAT:		AĞRIYA MÜDAHALE ŞEKLİ
PROTOKOL NO:	YAŞI:	AĞRININ YERİ : (Sözel İletişim Kurula bilen hastalarda)		İV <input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> DİĞER <input type="checkbox"/>

YÜZ AĞRI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (1-7 YAŞ) SAAT

0	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	SKOR													
0 – AĞRI YOK	1-2 ÇOK HAFİF AĞRI	3-4 HAFİF AĞRI	5-6 ORTA ŞİDDETLİ AĞRI	7-8 ŞİDDETLİ AĞRI	9-10 ÇOK ŞİDDETLİ AĞRI	TOPLAM:													

SAYISAL AĞRI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (7 YAŞ VE ÜSTÜ) SAAT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SKOR									
0 – AĞRI YOK	1-2 ÇOK HAFİF AĞRI	3-4 HAFİF AĞRI	5-6 ORTA ŞİDDETLİ AĞRI	7-8 ŞİDDETLİ AĞRI	9-10 ÇOK ŞİDDETLİ AĞRI	TOPLAM:														

DAVRANIŞSAL AĞRI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (ENTÜBE /SEDATİZE) SAAT

Kategoriler	1	2	3	4	SKOR															
YÜZ İFADESİ	Relaks	Kısmen Relaks	Kısmen Sert	Sert																
ÜST EKTREMİTE HAREKETLERİ	Hareket yok	Kısmen Hareket Var	Parmaklarda Fleksiyon	Ekstremiteler Retrakte																
VENTİLATÖRE UYUM	Tolere	Öksürüyor ama Tolere	Ventilatör ile savaşıyor	Ventilatör kontrolü kaybolmuş																
3 – AĞRI YOK	4-6 HAFİF AĞRI	7-9 ORTA ŞİDDETLİ AĞRI	10-12 ŞİDDETLİ AĞRI	TOPLAM:																

AĞRININ YENİDEN DEĞERLENDİRME SIKLIĞI

İLAÇ UYGULAMASI YAPILAN HASTALARDA AĞRININ YENİDEN DEĞERLENDİRME SIKLIĞI

AĞRI YOK	HAFİF AĞRI	ORTA ŞİDDETLİ AĞRI	ŞİDDETLİ AĞRI	İV İlaç Uygulanmış ise 15 dakika sonra	Oral İlaç Uygulanmışsa 60 dakika sonra
8 SAATTE BİR	2 SAATTE BİR	SAATTE BİR	YARIM SAATTE BİR	İM İlaç Uygulanmışsa 30 dakika sonra	

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
AĞRI DEĞERLENDİRME SKALALARI
(ÇOCUK HASTALAR İÇİN)

HASTA BİLGİLERİ	TARİH:	08-16 HEMŞİRE:	16-24 HEMŞİRE:	24-08 HEMŞİRE:
ADI – SOYADI:	SERVİSİ:	AĞRININ BAŞLADIĞI SAAT:		AĞRIYA MÜDAHALE ŞEKLİ İV PO DİĞER <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PROTOKOL NO:	YAŞI:	AĞRININ YERİ : (Sözel İletişim Kurula bilen hastalarda)		

NIPS AĞRI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (YENİDOĞAN - 1 YAŞ) **SAAT**

Kategoriler	0	1	2						
Yüz İfadesi	Sakin Yüz, Doğal İfade	Gergin Yüz Kasları, Kırıksık Alın ve Çene		SKOR					
Ağlama	Sessiz, Ağlamıyor	Hafif İnilti, Aralıklı Ağlama	Çığlık, Feryat, Yüksek Sesli Sürekli Ağlama						
Solunum Şekli	Her Zamanki Alışılmış Solunum	Değişken Düzensiz Her Zamankinden Hızlı Solunum, İç Çekme							
Kollar	Kas Rijiditesi Yok, Sıklıkla Gelişigüzel Kol Hareketleri	Gergin, Düz Kollar , Sert ve/veya Hızlı Ekstansiyon / Fleksiyon							
Bacaklar	Kas Rijiditesi Yok, Sıklıkla Gelişi Güzel Bacak Hareketleri	Gergin, Düz Bacaklar, Sert ve/veya Hızlı Ekstansiyon / Fleksiyon							
Uyanıklık Hali	Sessiz, Huzurlu, Uyuyor ve/veya Sakin	Canlı, Huzursuz ve sakinleştirilemeyen							
0 – AĞRI YOK		1-2 HAFİF AĞRI	3-4 ORTA ŞİDDETLİ AĞRI	>4 ŞİDDETLİ AĞRI	TOPLAM:				

FLACC AĞRI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POST – OPERATİF DÖNEM) **SAAT**

Kategoriler	0	1	2						
Yüz	Özel bir ifade veya gülümseme yok	Arasına yüz ekşitme, kaş çatma, çekilme, rahatsızlık	Sıklıkla kaş çatma, çeneyi sıkma , yanaklarda kasılma Titreme	SKOR					
Bacaklar	Normal pozisyon veya gevşeklik	Rahatsız-amaşsız kasılma	Tekme atma veya bacakları yukarı çekme						
Aktivite	Sessizce uzanıyor Normal pozisyon Kolaylıkla hareket ediyor	Kıvranıp arkaya/öne dönüyor Dirençli	Açılı duruyor Rijit veya tetik şeklinde						
Ağlama	Ağlama yok Uyanık veya uyuyor	Sızlanıyor veya inliyor	Hızla ağlıyor Çığlık atıyor, iç çekiyor						
Teselli Hali	Hayatından memnun rahat	Arasına dokunmakla, konuşmakla ve kucaklamakla teselli oluyor Dikkati dağıtılabiliyor	Teselli etmek veya rahat ettirmek güç						
0 – AĞRI YOK		1-3 HAFİF AĞRI	3-5 ORTA ŞİDDETLİ AĞRI	>5 ŞİDDETLİ AĞRI	TOPLAM:				

AĞRININ YENİDEN DEĞERLENDİRME SIKLIĞI

İLAÇ UYGULAMASI YAPILAN HASTALARDA
AĞRININ YENİDEN DEĞERLENDİRME SIKLIĞI

AĞRI YOK	HAFİF AĞRI	ORTA ŞİDDETLİ AĞRI	ŞİDDETLİ AĞRI	İV İlaç Uygulanmış ise 15 dakika sonra	Oral İlaç Uygulanmışsa 60 dakika sonra
8 SAATTE BİR	2 SAATTE BİR	SAATTE BİR	YARIM SAATTE BİR	İM İlaç Uygulanmışsa 30 dakika sonra	